



Болезни органов дыхания

При всех этих заболеваниях детей по возможности надо поместить в отдельной, хорошо проветриваемой комнате.

При сухом кашле рекомендуется давать для смягчения его пертуссин по одной чайной ложке 3-4 раза в день.

При насморке перед кормлением надо тщательно очистить нос ребенка с помощью ватного жгутика.

При пневмонии необходимо давать ребенку анти-биотики, лучше всего олеандомицин или эритромицин.

Данные лекарства применять в случаях, когда по каким-то причинам врачебная помощь задерживается.

При бронхиальной астме и астматическом бронхите рекомендуется введение 24 % раствора эуфиллина.

На каждой упаковке обозначается дозировка лекарственных средств, поэтому рассчитать необходимую дозу не составит труда.

При ларингоспазме и ларингостенозе, именуемом также крупом, который проявляется в виде приступа удушья.

При нарастающей одышке надо придать ребенку полусидячее положение, подложив под спину валик.

При удушье и остановке дыхания - начать оживление организма по программе АБС.

Отсасывание слизи из полости рта ребенка.

Встряхивание ребенка грудного возраста для удаления слизи или инородного тела.

Частота искусственного дыхания у новорожденных - 40 вдуваний в одну минуту, у детей старшего возраста - 20.

Источник: интернет-издание MED+info раздел Первая помощь на сайте medinfo